


## Graptemys kohni

**Nederlandse naam:** Zaagrug- of landkaartschildpad  
**Duitse naam:** Landkartenkröte  
**Engelse naam:** Mississippi map turtle



**Plaats in het dierenrijk:**

**Klasse:** Reptilia  
**Onderklasse:** Anapsida  
**Orde:** Testudines (Schildpadden)  
**Suborde:** Cryptodira (Halsbergers)  
**Familie:** Emydidae (Moerasschildpadden)

**Lengte:** Tot 30 cm (mannetjes ca. 10 cm kleiner).

**Herkomst:** De zaagrug- of landkaartschildpad komt voor in het midden en zuiden van Noord-Amerika.

**Terrariumtype:** De dieren moeten een redelijk ruim (afhankelijk van de grootte) aquaterrarium hebben. Daarin moet de waterhoogte zodanig zijn, dat de dieren, staand op hun achterpoten, de kop boven water kunnen krijgen. Een landdeel van platte stenen (bijv. leisteen) onder een warmtelamp is nodig als zonplek.

**Temperatuur:** 25 - 30 °C. (dagtemperatuur)

15 - 20 °C. (nachttemperatuur)

**Voedsel:** Deze alleseter heeft een voorkeur voor plantaardig voedsel. Allerlei soorten bladgroenten en zacht fruit kunnen dagelijks worden aangeboden. Het voedsel moet vooraf grondig worden gewassen. Van tijd tot tijd (vooral bij jongere dieren en mannetjes) kan dierlijk voedsel in de vorm van krekels worden aangeboden. Voedsel bestrooien met calciumpoeder met fosfor. Eén keer per week een vitaminepreparaat toedienen (zie ook 'water').

**Water:** Zeer regelmatig moet het water worden verversd. Gebruik altijd lauw water. Eén keer per week kan aan het water een vitaminepreparaat worden toegevoegd.

**Voortplanting:** De dieren zijn eierlegend. Het aantal eieren per legsel bedraagt 15 - 30 stuks.

**Overige opmerkingen:** Het is de meest bekende soort van de zaagrugschildpadden. Ze zijn vrij gemakkelijk te houden.

