

Tupinambis nigropunctatus

Nederlandse naam: Noordelijke reuzenteju
Duitse naam: Nördlicher Grosteju
Engelse naam: Northern tegu (Jacuaru)



Plaats in het dierenrijk:

Klasse: Reptilia
Onderklasse: Lepidosauria
Orde: Squamata (Hagedissen / slan
Suborde: Sauria (Hagedissen)gen
Infraorde: Scincomorpha (Skinkachtigen)
Familie: Teiidae (Tejuhagedissen)
Onderfamilie: Lacertidae (Echte hagedissen)

Lengte: tot 120 cm.

Herkomst: Open gebieden in de bossen van Zuid-Amerika.

Terrariumtype: Deze dieren vragen een ruim terrarium. Naast veel grondoppervlak (zand) moeten ze ook klimgelegenheid hebben in de vorm van grote stronken. Daarbij moet er goed op worden gelet dat deze goed vast liggen en niet kunnen kantelen of vallen! De klimmogelijkheden moeten ook een zonplaats kunnen bieden. In het algemeen moet het terrarium licht vochtig worden gehouden.

Temperatuur: ca 30 °C. (dagtemperatuur)

20 - 25 °C. (nachttemperatuur)

Voedsel: Hoewel het een alleseter is, heeft dit dier een voorkeur voor vlees. Het normale voedselaanbod (muizen, kikkers, vis, sprinkhanen, hart en ander mager vlees) moet worden aangevuld met zacht fruit. Voedseldieren voor het voeren bestrooien met calciumpoeder. Eén keer per week een vitaminepreparaat toedienen (zie ook 'water').

Water: De dieren vragen een grote waterbak. Het water daarin moet dagelijks worden ververs. Tevens moeten de dieren elke dag worden besproeid. Gebruik zowel voor de drinkbak als bij het sproeien lauw water. Eén keer per week moet aan het water een vitaminepreparaat worden toegevoegd.

Voortplanting: De dieren zijn eierlegend. Het aantal eieren per legsel bedraagt 4 tot 8 stuks.

Overige opmerkingen: Als geen dikke bodemlaag wordt gebruikt voor deze gravers, moet voor een schuilgelegenheid worden gezorgd.

