

Lamprophis aurora

Nederlandse naam: Afrikaanse huisslang
Duitse naam: Afrikanische Hausnatter
Engelse naam: African house snake



Plaats in het dierenrijk:
Klasse: Reptilia
Onderklasse: Lepidosauria
Orde: Squamata (hagedissen / slangen)
Suborde: Serpentes (slangen)
Infraorde: Caenophidia
Familie: Colubridae (ringslangachtigen)
Onderfamilie: Lycodontinae (wolfstandslangen)

Lengte: Tot 100 cm.

Herkomst: Zuid- en Zuidoost Afrika

Terrariumtype: Deze dieren vragen een zeer droog terrarium. Ze hebben zoveel mogelijk grondoppervlak nodig. Daarbij is een droge omgeving erg belangrijk. Zand is als bodembedekking aan te bevelen, liefst een dikke laag. Platte stenen kunnen worden toegevoegd. Belangrijk is ook dat de dieren een schuilgelegenheid hebben in een open steen, in open hout of in een grot.

Temperatuur: 28 - 35 °C. (dagtemperatuur)

ca. 20 °C. (nachttemperatuur)

Voedsel: Dit dier eet levende warmbloedige dieren: muizen, ratten, hamsters, cavia's, gerbils of kleine (loop-)vogels kunnen worden aangeboden. Calcium of vitamines hoeven bij deze prooidieren niet te worden bijgevoerd, behalve als bepaalde ziekten worden geconstateerd. Het originele voedsel zijn hagedissen. De grootte van het prooidier: houd 1½ keer de bekbreedte aan.

Water: De dieren vragen een kleine waterbak. Dagelijks moet het water worden verversd. Gebruik altijd lauw water. Eén keer per week kan aan het water een vitaminepreparaat worden toegevoegd.

Voortplanting: De dieren zijn eierlegend. Het aantal eieren per legsel bedraagt 8 tot 10 stuks.

Overige opmerkingen: Vooral 's nachts actief. Heeft een fors gebit.

